

12º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO DA UEMG

INCIDÊNCIA DE CO-INFECÇÃO PELA TUBERCULOSE EM PORTADORES DE HIV/AIDS EM UM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSOS-MG

Leandro Goulart Silva

Email para contato: leandrogoullart@hotmail.com

Palavras chave: Enfermagem, AIDS, Tuberculose

SILVA, Leandro Goulart; OLIVEIRA, Lídia Araújo; CARMO, Tânia Maria Delfraro

INTRODUÇÃO: A convergência das epidemias de tuberculose com a infecção pelo HIV é atualmente um dos maiores desafios para a saúde pública no mundo. A infecção pelo vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e sua evolução para a Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda hoje, quase 30 anos após a descoberta dos primeiros casos da doença, continua fazendo vítimas ao redor do mundo. A infecção não tratada com o HIV leva a uma imunodeficiência progressiva e aumenta a susceptibilidade as infecções, incluindo a Tuberculose (TB). A Tuberculose é uma das doença oportunista em portadores de HIV/AIDS e pode afetar de forma desfavorável a evolução clínica da doença, provocando um desequilíbrio no sistema imunológico do mesmo, comprometendo a qualidade de vida destes pacientes, bem como aumentando o risco de mortalidade. Diante disso surgiu o interesse em identificar os portadores de HIV/AIDS co-infectados pela tuberculose e analisar a adesão ao tratamento.**METODOLOGIA:** Estudo descritivo, com abordagem quantitativa, com a utilização do método de pesquisa documental. Os dados contidos estão sendo coletados nos prontuários dos portadores co-infectados pela AIDS e Tuberculose, cadastrados no Ambulatório Escola da Faculdade de Enfermagem de Passos. Estão cadastrados aproximadamente 180 pacientes em uso de anti-retrovirais, constituindo os sujeitos da pesquisa e que atendemos critérios de inclusão: prontuários de portadores de AIDS que fizeram tratamento com os anti-retroviral e que apresentaram qualquer tipo de tuberculose no período de 2000 a 2009. Utilizamos como instrumento, um formulário estruturado com questões geradoras. A análise dos dados será feita através da estatística descritiva e será apresentada através de gráficos e tabelas. **RESULTADOS PARCIAIS:** Dos 180 prontuários analisados, 93 portadores de HIV/AIDS são do sexo masculino e 87 do sexo feminino, com idade entre 20 a 60 anos, e prevalência do 1º grau incompleto. Do total de prontuários analisados, 10 portadores de HIV/AIDS apresentaram diagnóstico de tuberculose, sendo 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Foi verificado que a maioria dos co-infectados não aderiu ao tratamento com antiretrovirais e para tuberculose. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Pretendemos que este estudo sirva de subsídio na formulação de estratégias para sensibilizar os portadores de HIV/AIDS em relação à adesão ao tratamento, proporcionando a melhor qualidade de vida pela diminuição da incidência de infecções oportunistas. **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:** BRASIL. Ministério da Saúde. Programa nacional de DST e AIDS: Recomendações para terapia anti retroviral em adultos e adolescentes infectados pelo HIV: 2005/2006. 6 ed. Brasília, 2007. 306p. **INSTITUIÇÃO DE FOMENTO:** PIBIC/FAPEMIG